

抗がん剤プロトコール＜IRIS+BV＞

年 月 日

診療科・主治医

外来・入院() 患者ID 患者氏名 性別 男・女 年齢 歳

病名

身長 cm 体重 kg 体表面積 m² UGT1A1測定 未・済()

血清CRE mg/dl CLcr ml/min HBs抗原 ー・十

投与開始日 年 月 日 曜日 1クール 28日 予定クール数 クール

＜処方内容＞ TS-1(40～60mg/回 1日2回) mg/日

TS-1(20 ・ 25)mg 包/錠/Cap 分2

TS-1 14日間連日内服 14日間休薬 (※Day1夕より服用開始 Day15朝まで)

体表面積	TS-1投与量
1.25m ² 未満	40mg/回 (1日2回)
1.25m ² 以上1.5m ² 未満	50mg/回 (1日2回)
1.5m ² 以上	60mg/回 (1日2回)

TS-1腎機能障害時の投与量修正例(イリノテカン併用時)
(大鵬薬品適正使用基準)

Ccr≥80:初回基準量

80>Ccr≥60:慎重投与、
必要に応じて1段階以上の減量

Ccr<60:試験結果なし

Day1 年 月 日()

Day15 年 月 日()

[:]

①
グラニセトロン3mgバック100ml
デキサート6.6mg 1V
プロイメンド150mg 1V
30分かけて

サイン
()

[:]

②
生理食塩液100ml
アバスチン(5mg/kg) mg
(アバスチン400mg/16ml V;100mg/4ml V)
(全量 ml)
初回90分かけて
2回目60分かけて
3回目以降30分かけて

サイン
()

[:]

③
5%ブドウ糖液250ml
イリノテカン塩酸塩(100mg/m²) mg
〔イリノテカン100mg/5ml V;40mg/2ml V〕
(全量 ml) 90分かけて

サイン
()

[:]

④
生理食塩液50ml
30分かけて

サイン
()

【太枠内ケモセーフロック使用】

確認薬剤師

＜訂正箇所は赤字でお願いします。＞
＜下線部のみ記入して下さい。＞